

ABSTRAK

Indah Wahyuningsih
**LAPORAN KASUS PADA IBU NIFAS PASCA PREEKLAMPSIA DI
PUSKESMAS TARIK KABUPATEN SIDOARJO**

Preeklamsia merupakan suatu kondisi hipertensi yang muncul setelah melahirkan, biasanya terjadi dalam rentang waktu 48 jam sampai 6 minggu setelah melahirkan. Berdasarkan informasi dari Puskesmas Tarik Sidoarjo, pada periode Januari sampai Mei 2025, terdapat 2 kasus preeklamsia dari 50 ibu pasca persalinan yang berobat di puskesmas tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan laporan kasus ibu nifas pascapreeklamsia di Puskesmas Tarik. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan laporan kasus. Subjek penelitian adalah 1 pasien ibu pasca persalinan dengan preeklamsia. Data dikumpulkan di Puskesmas Tarik Sidoarjo pada tanggal 3 Februari sampai dengan 30 Mei 2025. Pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara, pengkajian fisik dan observasi studi dokumen asuhan kebidanan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pasien nifas pascapreeklamsia dapat ditangani dengan asuhan yang optimal melalui kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Dari catatan perkembangan, meskipun tekanan darah awalnya tinggi, kondisi tersebut dapat berangsur-angsur menurun. Tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang asuhan nifas. Dalam memberikan asuhan kebidanan kepada ibu nifas, penting untuk meningkatkan keterampilan dan intelektualitas mengenai asuhan kebidanan, untuk mencegah terjadinya preeklamsia yang dapat berakibat fatal. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu nifas pascapreeklamsia dilakukan melalui pemberian pelayanan yang memenuhi standar di puskesmas. Simpulan hasil penelitian, setiap tahapan dalam penanganan kasus ini memberikan kontribusi yang penting dalam mengatasi permasalahan ibu nifas pasca preeklamsia, yaitu dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius.

Kata Kunci: Laporan Kasus, Ibu Nifas, Pasca Preeklamsia

ABSTRACT

Indah Wahyuningsih

CASE REPORT ON POST-POST PREECLAMPSIA MOTHERS AT TARIK COMMUNITY HEALTH CENTER, SIDOARJO DISTRICT

Preeclampsia is a condition of hypertension that occurs after giving birth, usually within 48 hours to 6 weeks after giving birth. Based on information from the Tarik Sidoarjo Health Center, in the period from January to May 2025, there were 2 cases of preeclampsia out of 50 postpartum mothers who were treated at the health center. The purpose of this study was to describe case reports of postpartum mothers with preeclampsia at the Tarik Health Center. The approach method used in this study used a descriptive research design with a case report approach. The subject of the study was 1 postpartum mother patient with preeclampsia. Data were collected at the Tarik Sidoarjo Health Center from February 3 to May 30, 2025. This data collection used interview techniques, physical assessments and observation of midwifery care document studies. The results of the study and discussion showed that postpartum patients with preeclampsia can be treated with optimal care through collaboration with health workers. From the development records, although the initial blood pressure was high, the condition can continue to decrease. Health workers are very important to improve their skills and knowledge about postpartum care. In providing midwifery care to postpartum mothers, it is important to improve skills and intellectuality regarding midwifery care, to prevent preeclampsia which can be fatal. The implementation of midwifery care for postpartum mothers with post-preeclampsia is carried out through the provision of services that meet standards at the health center. The conclusion of the research results, each stage in handling this case makes an important contribution in overcoming the problems of postpartum mothers with post-preeclampsia, namely preventing more serious complications.

Keywords: Case Report, Postpartum Mother, Post-Preeclampsia

