

ABSTRAK

Khoirun Nisa'

LAPORAN KASUS ASUHAN KEBIDANAN PADA BAYI BARU LAHIR
DENGAN ASFIKSIA SEDANG DI PUSKESMAS DUPAK KOTA
SURABAYA

xiv + 14 Halaman + 5 Tabel + 7 Lampiran

Asfiksia pada BBL adalah kondisi gangguan pada bayi ditandai dengan ketidakmampuan menghirup udara langsung selama persalinan atau pasca lahir. Menurut data Puskesmas Dupak Kota Surabaya terdapat 1 dari 15 bayi yang mengalami kejadian asfiksia dalam bulan Mei 2024. Tujuan laporan kasus ini adalah untuk mendeskripsikan asuhan kebidanan pada bayi Ny. N Bayi Baru Lahir Aterm dengan asfiksia sedang di Puskesmas Dupak Kota Surabaya.

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan *Case Report* manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari langkah SOAP yaitu: pengkajian data subjektif dan objektif, analisa data, penatalaksanaan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pengkajian fisik, rekam medis, buku KIA, dan SIMPUS.

Hasil pengkajian data subjektif yang didapat dari Ny. N usia 27 tahun yaitu riwayat persalinan ini didapatkan air ketuban yang bercampur mekonium yang menjadikan faktor resiko terjadinya asfiksia. Data objektif menunjukkan bahwa bayi lahir tidak menangis, tonus otot lemah, dan ekstremitas kebiruan. Diagnosa yang ditegakkan adalah bayi Ny. N bayi baru lahir aterm dengan asfiksia sedang. Penatalaksanaan yang dilakukan adalah melakukan langkah awal resusitasi HAIKAP. Bayi langsung menangis kuat saat dirangsang taktil. Selanjutnya dilakukan asuhan pasca resusitasi. Setelah dilakukan asuhan kebidanan pada bayi Ny. N didapatkan hasil tidak ada komplikasi ataupun tanda bahaya pada bayi Ny. N. Semua langkah ini dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga masalah dapat teratasi.

Kata kunci: *Case Report*, Bayi Baru Lahir, Asfiksia

Daftar bacaan: 37 (2012-2024)

ABSTRACT

Khoirun Nisa'

CASE REPORT ON A NEWBORN WITH ASPHYXIA AT DUPAK HEALTH CENTER SURABAYA CITY

xiv + 14 Pages + 5 Tables + 7 Appendices

Asphyxia in BBL is a disorder condition in infants characterized by the inability to breathe air directly during labor or postnatal. According to data from the Dupak Health Center in Surabaya, there are 1 in 15 babies who experience asphyxia in May 2024. The purpose of this case report is to describe the obstetric care of Mrs. N premature newborns with moderate asphyxia at the Dupak Health

The method used is descriptive method with Case Report approach midwifery care management which consists of SOAP steps, namely: assessment of subjective and objective data, data analysis, management. Data collection techniques through observation, interviews, physical assessment, medical records, KIA books, and SIMPUS.

The results of the assessment of subjective data obtained from Ny. N the age of 27 years, the history of childbirth is obtained amniotic fluid mixed with meconium which makes the risk factor for asphyxia. Objective Data indicate that the baby was born not crying, weak muscle tone and bluish extremities. The diagnosis was that of the baby. N term newborns with moderate asphyxia. The management is to perform the initial steps of HAIKAP resuscitation. The baby immediately cries strongly when stimulated tactile. Further, post-resuscitation care is carried out. After midwifery care in infants Ny. N results obtained no complications or danger signs in infants Ny. N. All these steps are carried out precisely and according to the needs of the patient so that the problem can be resolved.

Keywords: Case Report, Newborn, Asphyxia

References:37 (2016-2024)