

ABSTRAK

Ananda Fitria

P27824522001

Laporan Kasus Ibu Nifas Dengan Anemia Di Wilayah Puskesmas Pungpungan Kabupaten Bojonegoro

Anemia terjadi ibu nifas akan menyebabkan dampak yang buruk bagi kesehatan ibu. Pada masa ibu nifas dengan anemia yang akan dialami pada ibu ketika ibu hamil hingga persalinan. Pada kelanjutan dari anemia ini pada ibu nifas ibu akan mudah mengeluh karena kondisi ibu yang kekurangan zat besi ibu akan mengalami mudah lemas dan mudah pusing. Kekurangan hemoglobin atau zat besi menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Berdasarkan data Profil Kesehatan Kabupaten Bojonegoro di Puskesmas Pungpungan kejadian ibu nifas dengan anemia tahun 2022 adalah 31 (10,54%) dari 294 jumlah ibu nifas. Dan kejadian anemia pada ibu nifas pada tahun 2023 adalah 69 (22,84%) dari 302 jumlah ibu nifas. Berdasarkan data Puskesmas Pungpungan kejadian anemia ibu nifas terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebesar 10,5% dan pada tahun 2023 sebesar 22,84%. Mendeskripsikan Asuhan Kebidanan yang diberikan kepada Ibu Nifas dengan Anemia di Wilayah Puskesmas Pungpungan Kabupaten Bojonegoro yang dilakukan pada Ny.S P101A0 27 tahun, nifas hari ke-7 dengan Anemia keadaan umum ibu baik, tekanan darah 105/86 mmHg, 67x/menit, pernafasan 20x/menit.

Pendekatan laporan kasus manajemen asuhan kebidanan yaitu terdiri tujuh Langkah varney yang terdiri dari mengumpulkan data pasien, interpretasi, mendiagnosa potensial, Tindakan segera yang dibutuhkan, perencanaan dan mengevaluasi hasil dari pemeriksaan

Hasil dari penelitian ini yaitu Ibu Nifas dengan Anemia dapat diobati dengan memberikan tablet tambah darah dan melakukan asuhan kebidanan dan kunjungan rumah di ibu. Pada catatan perkembangan ibu dapat disimpulkan bahwa keadaan ibu baik kadar hemoglobin ibu meningkat pada kunjungan selanjutnya ibu mengeluh sering pusing karena ibu lupa meminum obat tablet tambah darah sehingga kadar hemoglobin ibu menurun sehingga ibu perlu perawatan lebih untuk kebutuhan nutrisi, kebutuhan istirahat dan rutin meminum tablet tambah darah. Setelah dilakukan perawatan lebih kondisi ibu membaik dan kadar hemoglobin ibu meningkat.

Pada tujuh langkah menurut Varney yang terdiri dari Pengumpulan data dasar mengidentifikasi diagnose potensial, Tindakan segera, Intervensi, Implementasi dan Evaluasi. Semua langkah ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga masalah dapat diatasi.

Kata Kunci : Laporan Kasus Nifas, Anemia

ABSTRACT

Ananda Fitria

P27824522001

Case Report of Postpartum Mother with Anemia at Puskesmas Pungpungan, Bojonegoro Regency

Anemia in postpartum women can have adverse effects on maternal health. During the postpartum period, anemia experienced by women from pregnancy through childbirth can lead to complications. As a result of this anemia, postpartum women may easily complain of fatigue and dizziness due to iron deficiency. A lack of hemoglobin or iron causes the body to be deficient in oxygen. According to data from the Bojonegoro District Health Profile at the Pungpungan Health Center, the incidence of postpartum anemia in 2022 was 31 cases (10.54%) out of 294 postpartum women. In 2023, the incidence of postpartum anemia was 69 cases (22.84%) out of 302 postpartum women. Based on data from the Pungpungan Health Center, the incidence of anemia in postpartum women increased by 10.5% in 2022 and by 22.84% in 2023. Describing the midwifery care provided to postpartum mothers with anemia in the Pungpungan Health Center area of Bojonegoro District, conducted on Mrs. S P101A0, 27 years old, on the 7th day postpartum with anemia, the mother's general condition was good, blood pressure 105/86 mmHg, 67 beats per minute, respiration 20 breaths per minute.

The approach to the case report on midwifery care management consists of seven Varney steps: collecting patient data, interpretation, potential diagnosis, immediate actions required, planning, and evaluating the results of the examination.

The results of this study indicate that postpartum women with anemia can be treated by administering iron supplements and providing midwifery care and home visits. In the mother's progress notes, it can be concluded that the mother's condition was good, with her hemoglobin levels increasing. However, during the next visit, the mother complained of frequent dizziness because she had forgotten to take her iron tablets, causing her hemoglobin levels to decrease. As a result, the mother required additional care for her nutritional needs, rest requirements, and regular intake of iron tablets. After receiving additional care, the mother's condition improved, and her hemoglobin levels increased.

Following the seven steps outlined by Varney, which include: collecting baseline data, identifying potential diagnoses, immediate actions, interventions, implementation, and evaluation. All these steps were carried out according to the patient's needs, enabling the issue to be resolved.

Keywords: Postpartum Case Report, Anemia