

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BALITA DI WILAYAH PUSKESMAS PACAR KELING SURABAYA

Oleh : Rr. Ayu Fadilazka Puspitaningrum

Pneumonia ialah salah satu alasan utama mengapa angka kematian bayi begitu tinggi di mana-mana, terutama di Indonesia. Pneumonia masih sangat umum di Surabaya, terutama di sekitar Puskesmas Pacar Keling. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pneumonia pada balita di wilayah tersebut. Penelitian menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel terdiri 52 balita yang dipilih secara purposive sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mencakup informasi mengenai status gizi, riwayat imunisasi, pemberian ASI eksklusif, serta kebiasaan merokok anggota keluarga. Hasil menunjukkan sebagian besar balita mempunyai status gizi baik (86,5%), menerima ASI eksklusif (69,2%), dan mendapatkan imunisasi lengkap (88,5%). Namun, mayoritas (80,8%) tinggal bersama anggota keluarga terutama ayah yang merokok di dalam rumah. Analisis data mengungkapkan faktor yang paling berkaitan dengan kejadian pneumonia meliputi status imunisasi, riwayat pemberian ASI eksklusif, serta paparan asap rokok, sementara status gizi juga berhubungan tetapi tidak sekuat faktor lainnya. Kesimpulannya, kejadian pneumonia pada balita dipengaruhi oleh kombinasi faktor intrinsik dan ekstrinsik. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan cakupan imunisasi, mendorong pemberian ASI eksklusif, serta memberikan edukasi kepada keluarga mengenai bahaya asap rokok. Intervensi berbasis keluarga dan promosi rumah sehat diharapkan mampu menekan angka kejadian pneumonia balita di masa mendatang

Kata Kunci: Pneumonia, Balita, status gizi, ASI Eksklusif, Imunisasi, Asap Rokok

ABSTRACT

FACTORS ASSOCIATED WITH PNEUMONIA HEALTH CENTER AREA OF SURABAYA

By: Rr. Ayu Fadilazka Puspitaningrum

Pneumonia is a major cause of high infant mortality rates everywhere, especially in Indonesia. Pneumonia remains highly prevalent in Surabaya, particularly around the Pacar Keling Community Health Center (Puskesmas Pacar Keling). This study aims to identify factors associated with the incidence of pneumonia in toddlers in the area. The study used a descriptive design with a cross-sectional approach. The sample consisted of 52 toddlers purposively selected according to predetermined criteria. Data were collected through a questionnaire that included information on nutritional status, immunization history, exclusive breastfeeding, and smoking habits of family members. The results showed that most toddlers had good nutritional status (86.5%), received exclusive breastfeeding (69.2%), and received complete immunizations (88.5%). However, the majority (80.8%) lived with family members, especially fathers, who smoked at home. Data analysis revealed that the factors most associated with pneumonia included immunization status, exclusive breastfeeding history, and exposure to cigarette smoke. Nutritional status also had a less strong association than the other factors. In conclusion, the incidence of pneumonia in toddlers is influenced by a combination of intrinsic and extrinsic factors. Preventive measures can be implemented by increasing immunization coverage, encouraging exclusive breastfeeding, and educating families about the dangers of cigarette smoke. Family-based interventions and promoting healthy homes are expected to reduce the incidence of childhood pneumonia in the future.

Keywords: *Pneumonia, Toddlers, Exclusive Breastfeeding, Immunization, Cigarette Smoke*