

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU DALAM PEMBERIAN IMUNISASI BCG DI DESA TEGALBANG WILAYAH KERJA PUSKESMAS SUMURGUNG**

Oleh :

**NENG ESTI WIBOWO**  
**NIM.P27820522035**

Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan global yang masih tinggi prevalensinya, termasuk pada bayi. Pemberian imunisasi BCG merupakan salah satu upaya pencegahan yang efektif. Namun, cakupan imunisasi BCG di Desa Tegalbang pada tahun 2024 hanya mencapai 57,38%, jauh di bawah target nasional sebesar 95%, sehingga meningkatkan risiko kejadian TBC pada bayi dan balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ibu dalam pemberian imunisasi BCG di Desa Tegalbang wilayah kerja Puskesmas Sumurgung.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan jumlah populasi sebanyak 61 ibu yang memiliki bayi usia 0–12 bulan. Sampel sebanyak 53 orang diperoleh menggunakan teknik Simple Random Sampling. Variabel penelitian meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, sikap, dukungan keluarga, dan jarak ke fasilitas kesehatan. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi.

Hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar ibu memiliki pengetahuan rendah, sebagian besar sikap ibu negatif, sebagian besar ibu tidak mendapat dukungan keluarga, dan sebagian besar ibu memiliki jarak tempat tinggal dalam kategori dekat dengan pelayanan kesehatan.

Pengetahuan yang rendah, sikap yang negatif, serta minimnya dukungan keluarga menjadi penghambat utama dalam pemberian imunisasi BCG. Upaya peningkatan cakupan imunisasi perlu difokuskan pada edukasi kepada ibu dan pelibatan aktif keluarga dalam mendukung pelaksanaan imunisasi.

**Kata kunci: Faktor yang mempengaruhi ibu, Imunisasi pada bayi, BCG**

## **ABSTRACT**

### ***FACTORS INFLUENCING MOTHERS IN THE ADMINISTRATION OF BCG IMMUNIZATION IN TEGALBANG VILLAGE, WORKING AREA OF SUMURGUNG PUBLIC HEALTH CENTER***

**By:**

**NENG ESTI WIBOWO**  
**NIM. P27820522035**

*Tuberculosis (TB) remains a major global health issue, with high prevalence rates, including among infants. The Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccination is an effective preventive measure. However, in 2024, BCG immunization coverage in Tegalbang Village reached only 57.38%, far below the national target of 95%, thereby increasing the risk of TB incidence in infants and young children. This study aims to identify the factors influencing mothers in providing BCG immunization in Tegalbang Village, under the jurisdiction of Sumurgung Public Health Center.*

*This research employed a descriptive design with a population of 61 mothers of infants aged 0–12 months. A sample of 53 mothers was selected using simple random sampling. The variables studied included age, education, occupation, knowledge, attitude, family support, and distance to health facilities. Data were collected through questionnaires and analyzed descriptively using frequency distribution.*

*The results of the study showed that most mothers had low levels of knowledge, negative attitudes, lacked family support, and lived in close proximity to health care facilities.*

*Low knowledge, negative attitudes, and limited family support are the main barriers to the administration of BCG immunization. Efforts to increase immunization coverage should focus on providing education to mothers and actively involving families in supporting immunization implementation.*

***Keywords: Maternal influencing factors, Infant immunization, BCG***