

ABSTRAK

ASUHAN KEPERAWATAN PERFUSI PERIFER TIDAK EFEKTIF PADA PASIEN KANKER CERVIX DENGAN INTERVENSI PERAWATAN Sirkulasi Di Ruang Flores 2 RSPAL DR. RAMELAN SURABAYA

Pendahuluan : Kanker serviks merupakan salah satu penyebab utama kematian pada perempuan di seluruh dunia. Gejala yang paling sering muncul pada penderita kanker serviks adalah perdarahan hebat. Kondisi perdarahan yang cukup masif ini dapat meningkatkan risiko terjadinya anemia dan syok hipovolemik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk asuhan keperawatan yang dapat dilakukan oleh perawat pada pasien kanker serviks dengan masalah ketidakefektifan perfusi perifer yang dirawat di Ruang Flores 2 RSPAL Dr. Ramelan Surabaya

Metode : Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study), yang fokus secara mendalam pada satu objek atau kasus tertentu.

Hasil : Masalah keperawatan terkait perfusi perifer tidak efektif pada pasien kanker serviks telah diberikan intervensi berupa perawatan sirkulasi sesuai dengan pedoman SIKI 2017. Implementasi dari intervensi ini dilakukan dengan merujuk pada rencana yang telah dibuat sebelumnya. Setelah implementasi dilakukan, evaluasi menunjukkan bahwa masalah keperawatan dapat teratasi.

Kesimpulan : Masalah ketidakefektifan perfusi perifer pada pasien dengan kanker serviks yang menjalani perawatan di ruang rawat inap Flores 2 dapat diatasi dengan implementasi selama 3x24 jam. Oleh karena itu, disarankan agar perawat lebih meningkatkan tindakan keperawatan dan motivasi kepada pasien untuk menjalani perawatan dengan baik, guna mencegah terjadinya komplikasi yang dapat terjadi pada penderita kanker serviks.

Kata Kunci : Asuhan Keperawatan, Kanker Serviks, Perfusi perifer tidak efektif..

ABSTRACT

NURSING CARE FOR INEFFECTIVE PERIPHERAL PERFUSION IN CERVICAL CANCER PATIENTS WITH CIRCULATORY CARE INTERVENTIONS AT FLORES 2 ROOM, DR. RAMELAN HOSPITAL, SURABAYA

Introduction: Cervical cancer is one of the leading causes of death among women worldwide. The most common symptom experienced by cervical cancer patients is severe bleeding. This massive bleeding condition can increase the risk of anemia and hypovolemic shock. This study aims to analyze the form of nursing care that can be provided by nurses to cervical cancer patients with ineffective peripheral perfusion problems who are being treated in the Flores 2 Ward at RSPAL Dr. Ramelan Surabaya..

Objective: This study aims to analyze the nursing care that can be provided to patients with cervical cancer who have ineffective peripheral perfusion problems, treated in Flores 2 Ward at RSPAL Dr. Ramelan Surabaya.

Method: This study employs a case study approach, focusing intensively on a specific object or case.

Result: The nursing problem of ineffective peripheral perfusion in cervical cancer patients was addressed with interventions, including circulation care according to SIKI 2017 guidelines. The implementation of these interventions was carried out based on the established plan. After implementation, evaluation showed that the nursing problem was resolved.

Conclusion: The problem of ineffective peripheral perfusion in cervical cancer patients undergoing treatment in the Flores 2 inpatient ward can be resolved through nursing care implementation within 3x24 hours. Therefore, it is recommended that nurses enhance nursing interventions and provide motivation to patients to undergo proper treatment in order to prevent complications that may occur in cervical cancer patients.

Keywords : Nursing Care, Cervical Cancer, Ineffective Peripheral Perfusion