

ABSTRAK

Retno Wigati

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN DIARE
PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CANDI
SIDOARJO**

xv + 44 Halaman +7 Tabel + 8 Lampiran

Diare tetap menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas yang tinggi di seluruh dunia.. Penyakit Ini mempengaruhi semua kalangan usia tanpa pengecualian. Namun, anak-anak balita sangat rentan karena sistem kekebalan mereka belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, mereka rentan terhadap infeksi oleh bakteri, virus, dan parasit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare pada anak-anak di daerah Puskesmas Candi (Kabupaten Sidoarjo). Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan melibatkan 44 responden. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki sumber air bersih (68%), jamban sehat (66%), namun masih terdapat SPAL dan tempat sampah yang tidak memenuhi syarat (masing-masing 48% dan 52%). Selain itu, meskipun mayoritas ibu memiliki perilaku mencuci tangan yang baik (86%), kejadian diare masih ditemukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor lingkungan dan perilaku terutama terkait SPAL, pengolahan sampah, dan kebersihan tangan memiliki peranan penting dalam kejadian diare pada balita. Diperlukan upaya edukasi dan peningkatan fasilitas sanitasi untuk menurunkan prevalensi diare pada balita di wilayah Puskesmas Candi Sidoarjo.

Kata kunci : Faktor lingkungan, Balita, Diare

ABSTRAK

Retno Wigati

FACTORS INFLUENCING THE INCIDENCE OF DIARRHEA IN TODDLERS IN THE WORK AREA OF CANDI PUBLIC HEALTH CENTER, SIDOARJO

xv + 44 Pages + 7 Table + 8 Appendices

Diarrhea remains a major cause of high morbidity and mortality worldwide. This disease affects all age groups without exception. However, toddlers are particularly vulnerable because their immune systems are not yet fully developed. Therefore, they are susceptible to infections by bacteria, viruses, and parasites. The aim of this study is to investigate the factors that influence the incidence of diarrhea in children in the Candi Health Center area (Sidoarjo Regency). This study employed a descriptive method involving 44 respondents. Data collection used observation sheets. The results showed that most respondents had a clean water source (68%), a healthy toilet (66%), but there were still substandard wastewater treatment plants (SPAL) and trash cans (48% and 52%, respectively). Furthermore, although the majority of mothers practiced good handwashing (86%), diarrhea cases were still found. The study concluded that environmental and behavioral factors, particularly those related to SPAL, waste management, and hand hygiene, play a significant role in the incidence of diarrhea in toddlers. Educational efforts and improvements to sanitation facilities are needed to reduce the prevalence of diarrhea in toddlers in the Candi Sidoarjo Community Health Center.

Keywords: Factors, Toddlers, Diarrhea