

ABSTRAK

Darti Susilowati

P27824425177

HUBUNGAN IMT DENGAN KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU
HAMIL TRIMESTER 3 DI PUSKESMAS TAKERAN KABUPATEN
MAGETAN

xiv + 79 halaman + 9 tabel + 7 lampiran

Pengukuran IMT sebagai satu indikator yang digunakan memperkirakan risiko terjadinya preeklampsia pada kehamilan. Kondisi berat badan berlebih dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kenaikan tekanan darah, terutama selama masa kehamilan. Tingginya tekanan darah pada arteri terjadi akibat kebutuhan oksigen bertambah dan aliran darah yang dipicu oleh kenaikan bobot tubuh yang cepat selama kehamilan. Penelitian berikut bertujuan untuk menganalisis hubungan IMT dengan peristiwa preeklampsia pada ibu hamil trimester 3 di Puskesmas Takeran, Kabupaten Magetan.

Jenis riset adalah *kuantitatif* dengan pendekatan survey analitik. Seluruh wanita hamil trimester 3 pada tahun 2025 di Wilayah kerja Puskesmas Takeran sebanyak 210 menjadi populasi riset ini. Penelitian ini melibatkan 138 ibu hamil diperoleh dengan metode simple random sampling. Rekap data kohort sebagai instrument penelitian, sedangkan analisis dilakukan menggunakan uji *Fisher Exact Tes*.

Temuan riset menyatakan data sebagian besar ibu hamil trimester 1 mempunyai IMT gemuk. Wanita hamil trimester 3 rata-rata tidak menghadapi preeklampsia. IMT berhubungan dengan peristiwa preeklampsia pada wanita hamil trimester 3. Tenaga kesehatan perlu mengoptimalkan edukasi terkait penerapan gizi yang seimbang dan beragam. Observasi peningkatan bobot tubuh yang ideal pada masa kehamilan disesuaikan dengan IMT ibu

Kata Kunci: hamil, trimester 3, IMT, preeklampsia

Daftar Bacaan : 8 buku (2018 – 2024)

ABSTRACT

Darti Susilowati

P27824425177

THE RELATIONSHIP BETWEEN BMI AND THE INCIDENCE OF PREECLAMPSIA IN PREGNANT WOMEN IN THE 3RD TRIMESTER AT THE TAKERAN PUBLIC HEALTH CENTER, MAGETAN DISTRICT

xiv + 79 pages + 9 tables + 7 appendices

This BMI measurement is one of the components in predicting the occurrence of preeclampsia in pregnancy . Being overweight can increase a person's blood pressure, especially during pregnancy. This increase in blood pressure in the artery walls is caused by the increased need for blood to supply oxygen to body tissues and also by increased blood flow in the blood vessels caused by excessively rapid weight gain in a relatively short period of time during pregnancy. This study aims to analyze the relationship between BMI and the incidence of preeclampsia in pregnant women in the third trimester at the Takeran Community Health Center, Magetan Regency.

Type study is quantitative with analytical survey approach . Population study is all over Mother pregnant in the 3rd trimester in 2025 in the work area Community Health Center Takeran is as many as 210. Retrieval techniques sample use simple random sampling . Number sample of 138 mothers pregnant . Instrument study This is recap cohort data collection . Data analysis using statistical tests Fisher Exact Test.

Research result This shows partial data big Mother 1st trimester pregnant has a fat BMI . Mother pregnant in the third trimester big No experience preeclampsia . BMI is related with incident preeclampsia in mothers third trimester of pregnancy. Health workers For increase education nutrition balanced and diverse. Monitoring increase ideal body weight during pregnancy customized with mother's BMI

Keywords : pregnant , 3rd trimester, BMI, preeclampsia

Reference : 8 books (2018 – 2024)