

ABSTRAK

Azizah

HUBUNGAN PARITAS, USIA IBU, DAN BERAT BADAN BAYI DENGAN KEJADIAN LASERASI PERINEUM PADA PERSALINAN NORMAL

xv + 62 Halaman + 8 Tabel + 4 Gambar + 17 Lampiran

Laserasi perineum merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi pada persalinan normal dan dapat menyebabkan perdarahan, nyeri pascapersalinan, serta meningkatkan risiko infeksi. Kondisi ini dapat memengaruhi proses pemulihan ibu setelah melahirkan dan menimbulkan ketidaknyamanan yang berkepanjangan apabila tidak ditangani dengan baik. Kejadian laserasi perineum masih cukup tinggi sehingga diperlukan identifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian tersebut sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kualitas pelayanan kebidanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan paritas, usia ibu, dan berat badan bayi dengan kejadian laserasi perineum pada persalinan normal.

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain *cross-sectional* yang dilaksanakan di TPMB Siti Zainab. Sampel penelitian berjumlah 184 ibu bersalin normal yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Data penelitian diperoleh dari data sekunder yang berasal dari buku register persalinan dan rekam medis. Analisis data dilakukan secara bivariat menggunakan uji *Pearson Chi-Square* untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian laserasi perineum ($p < 0,001$) dan terdapat hubungan antara berat badan bayi dengan kejadian laserasi perineum ($p < 0,001$). Usia ibu tidak berhubungan dengan kejadian laserasi perineum ($p = 0,589$). Paritas dan berat badan bayi berhubungan dengan kejadian laserasi perineum pada persalinan normal, sedangkan usia ibu tidak berhubungan dengan kejadian laserasi perineum. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya identifikasi faktor risiko selama masa kehamilan dan persalinan guna mendukung upaya pencegahan serta meningkatkan kualitas asuhan kebidanan yang diberikan kepada ibu bersalin.

Kata kunci: laserasi perineum, paritas, usia ibu, berat badan bayi.

ABSTRACT

Azizah

THE RELATIONSHIP BETWEEN PARITY, MATERNAL AGE, AND INFANT BIRTH WEIGHT WITH THE INCIDENCE OF PERINEAL LACERATION IN NORMAL DELIVERY

xv + 62 Pages + 8 Tables + 4 Figures + 17 Appendices

Perineal laceration is a common complication in normal childbirth that can lead to hemorrhage, postpartum pain, and an increased risk of infection. This condition may affect the maternal recovery process and cause prolonged discomfort if not managed properly. The incidence of perineal lacerations remains high, necessitating the identification of associated risk factors as a means of prevention and improving the quality of midwifery care. This study aims to analyze the relationship between parity, maternal age, and infant birth weight with the incidence of perineal lacerations in normal childbirth.

This study employed an observational analytic method with a cross-sectional design, conducted at TPMB Siti Zainab. The research sample consisted of 184 mothers undergoing normal childbirth, selected using purposive sampling based on established inclusion and exclusion criteria. Research data were obtained from secondary sources, including childbirth registers and medical records. Data analysis was performed bivariately using the Pearson Chi-Square test to determine the relationship between independent and dependent variables.

This study showed a significant relationship between parity and the incidence of perineal laceration ($p < 0.001$), as well as a significant relationship between infant birth weight and the incidence of perineal laceration ($p < 0.001$). Regarding maternal age, this study found no significant relationship with the incidence of perineal laceration ($p = 0.589$). Parity and infant birth weight are associated with the incidence of perineal laceration in normal childbirth, whereas maternal age is not. This study highlights the importance of identifying risk factors during pregnancy and childbirth to support prevention efforts and enhance the quality of midwifery care provided to laboring mothers.

Keywords: perineal laceration, parity, maternal age, infant birth weight