

ASUHAN KEPERAWATAN RISIKO PERILAKU KEKERASAN PADA PASIEN SKIZOFRENIA PARANOID DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR SURABAYA

Linda Dwi Safitri¹, Kastubi, S.Kep.Ns., M.Kes², Dr. Jujuk Proboningsih, SKp., M.Kes³

Program Studi DIII Keperawatan Soetomo, Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Surabaya
Jl. Prof. Dr. Moestopo No 8c Surabaya, Telp. (031)5030379

Abstrak

Risiko Perilaku kekerasan merupakan suatu fenomena yang sering kali terjadi pada penderita skizofrenia paranoid dimana seseorang tersebut percaya bahwa orang lain membencinya. Menurut penelitian diagnosa terbanyak pada gangguan kejiwaan yaitu perilaku kekerasan karena diagnosa ini memiliki jumlah terbanyak dibanding diagnosa lain yaitu 32%. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian mengenai asuhan keperawatan risiko perilaku kekerasan pada klien skizofrenia paranoid dengan tujuan memperoleh informasi baru dan sebagai bahan perbandingan serta referensi bagi perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dalam bentuk studi kasus dengan pendekatan asuhan keperawatan, yang meliputi pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Unit analisis yang diteliti yakni dua pasien skizofrenia paranoid di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dengan masalah utama risiko perilaku kekerasan. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dengan subjek penelitian, menggunakan catatan rekam medis dan observasi umum. Instrumen pengumpulan data menggunakan format asuhan keperawatan jiwa dari buku Proses Keperawatan Jiwa, Keliat. B.A dkk.

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan bahwa risiko perilaku kekerasan pada skizofrenia disebabkan karena sebelumnya klien mengalami suatu stressor menengangkan yang mengancam ego, ancaman tersebut dipersepsi mengganggu konsepsi diri atau integritas diri, sedangkan aktualisasi pasien belum tercapai, sehingga pasien mengalami harga diri rendah.

Diharapkan bagi klien risiko perilaku kekerasan pada skizofrenia paranoid mentaati program terapi yang diberikan serta rutin kontrol dan minum obat. Selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media informasi tentang kesehatan dan sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

Kata kunci: Asuhan Keperawatan, Risiko Perilaku Kekerasan, Skizofrenia Paranoid

NURSING CARE OF VIOLENT BEHAVIOR RISK IN PARANOID SCHIZOPHRENIA PATIENTS AT MENUR MENTAL HOSPITAL SURABAYA

Linda Dwi Safitri¹, Kastubi, S.Kep.Ns., M.Kes², Dr. Jujuk Proboningsih, SKp., M.Kes³

Diploma III Program of Study in Soetomo's Nursing, Health Polytechnic Ministry of Health Surabaya
Jl. Prof. Dr. Moestopo No 8c Surabaya, Telp. (031)5030379

Abstract

Risk of violent behavior is a phenomenon that often occurs in people with paranoid schizophrenia where someone believes that others hate it. According to research the most diagnoses in psychiatric disorders is violent behavior because this diagnosis has the highest number compared to other diagnoses which is 32%. Therefore, the authors conducted research on nursing care for the risk of violent behavior in paranoid schizophrenic clients with the aim of obtaining new information and as a comparison and reference for nursing development so as to improve the quality of nursing care related to the problem.

This research is using descriptive research method in form of case study with approach nursing care, which covers assessment, diagnosis, planning implementation and evaluation. Analysis unit that two paranoid schizophrenia patients at Menur Mental Hospital Surabaya with the main problem being the risk of violent behavior. Research data were collected using interviews with research subjects, using medical records and general observations. Data collection instruments using the format of Psychiatric Nursing from the book of mental nursing processes, Keliat, B.A dkk.

Based on data analysis, was obtained conclusions the risk of violent behavior in schizophrenia is caused by the client having experienced a stressful stressor that threatens the ego, the threat is perceived to interfere with self conception or self integrity, whereas the patient's actualization has not been reached, so the patient experiences low self-esteem

It is expected that the client risks violent behavior in paranoid schizophrenia adhering to the therapy program that is given as well as routine control and taking medication. it is expected that the results of this study can be used as a medium of information about health and as input for further research

Keyword: nursing Care, Violent Behavior Risk, Paranoid Schizophrenia .