

ABSTRAK

DUKUNGAN KELUARGA DALAM KEPATUHAN KUNJUNGAN ANTENATAL CARE (ANC) PADA IBU PREEKLAMPSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS JAGIR SURABAYA

Oleh: Dwi Wahyuningati

Kejadian preeklampsia memiliki pengaruh yang sangat besar pada kehamilan. Penyakit ini dapat ditandai dengan adanya hipertensi dan edema, serta dapat disertai dengan proteinuria. Preeklampsia dapat dideteksi sedini mungkin dengan melalui pemeriksaan antenatal care secara teratur dimulai dari trimester I sampai dengan Trimester III. Ketidakpatuhan ini dapat dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya dukungan dari anggota keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dukungan keluarga dan kepatuhan kunjungan pemeriksaan antenatal care pada ibu preeklampsia di Puskesmas Jagir Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah ibu hamil dengan preeklampsia sebanyak 30 ibu hamil. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik total sampling. Dukungan keluarga ibu preecklampsia di Puskesmas Jagir hampir setengahnya (40%) memberikan dukungan keluarga yang baik. Ibu preeklampsia trimester 2 sebagian kecil (27%) sangat patuh mengunjungi antenatal care dan ibu preeklampsia trimester 3 sebagian besar (53%) sangat patuh mengunjungi antenatal care. Ibu preeklampsia trimester 2 hampir seluruhnya (75%) mendapatkan dukungan keluarga kurang dan sangat patuh mengunjungi *antenatal care*. Dukungan keluarga pada ibu preeklampsia trimester 3 yang mendapatkan dukungan keluarga baik seluruhnya (100%) sangat patuh mengunjungi pemeriksaan *antenatal care*. Keluarga diharapkan lebih memperhatikan ibu hamil. Perhatian ini bisa dilakukan dengan cara memberi perhatian, menanyakan perkembangan janin dan meluangkan waktu untuk menemani periksa kehamilan ke petugas kesehatan. Ibu hamil diharapkan lebih teratur dan tepat jadwal dalam melakukan pemeriksaan kehamilan ke petugas Kesehatan.

Kata Kunci: Preeklampsia, Dukungan Keluarga, Kepatuhan Kunjungan *antental care*

ABSTRACT

FAMILY SUPPORT IN ANTENATAL CARE (ANC) VISIT COMPLIANCE WITH PREECLAMPTIC MOTHERS IN THE JAGIR PUBLIC HEALTH CENTER, SURABAYA

By: Dwi Wahyuningati

The incidence of preeclampsia has a huge influence on pregnancy. This disease can be characterized by hypertension and edema; besides, it can be followed by proteinuria. Furthermore, preeclampsia can be detected as early as possible through regular antenatal care check starting from the first trimester to the third trimester. This non-compliance can be influenced by several factors, one of which is that the lack of support from family members. The aim of this study is that to determine family support and obedience to antenatal care visits for pregnant woman with preeclampsia at the Jagir Public Health Center Surabaya. This study used descriptive research method. The samples in this study were pregnant women with preeclampsia as many as 30 pregnant women. Moreover, this sampling technique used a total sampling technique. The family of pregnant women with preeclampsia at the Jagir Public Health Center almost a half (40%) has good family support. A small percentage of pregnant women with preeclampsia in the second trimester (27%) are very obedient in visiting antenatal care and the majority of pregnant women with preeclampsia in the third trimester (53%) are very obedient in visiting antenatal care. Almost all of the pregnant women with preeclampsia (75%) in 2nd trimester get less family support and they are very obedient in visiting antenatal care. In addition, families are expected to pay more attention to pregnant women. This attention can be done by paying attention, asking the development of the fetus and taking the time to accompany the pregnancy check up to the health worker. Pregnant women are expected to be more regular and on schedule in conducting pregnancy check up to health workers.

Keywords: Preeclampsia, Family Support, Compliance with visits antenatal care