

Darah_Puasa_dan_HbA1C_Pekerja_Kantor_dengan_Obesitas_Sentral.pdf

by

Submission date: 17-Apr-2023 09:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2066593414

File name: Darah_Puasa_dan_HbA1C_Pekerja_Kantor_dengan_Obesitas_Sentral.pdf (77.46K)

Word count: 1827

Character count: 11174

Indeks Massa Tubuh (IMT), Glukosa Darah Puasa dan HbA1C Pekerja Kantor dengan Obesitas Sentral

1 Anik Handayati

Jurusan Teknologi Laboratorium Medik, Poltekkes Kemenkes Surabaya; anik_handayati@yahoo.co.id (koresponden)

1 Christ Kartika Rahayuningsih

Jurusan Teknologi Laboratorium Medik, Poltekkes Kemenkes Surabaya; chrstkartika@gmail.com

1 Winarni

Jurusan Teknologi Laboratorium Medik, Poltekkes Kemenkes Surabaya

ABSTRACT

29

12 Central obesity is excess body weight as a result of the accumulation of intra abdominal and subcutaneous fat that occurs in the abdominal area which causes insulin resistance. Central obesity is caused by excessive food intake and decreased physical activity that often occurs in office workers. Central obesity can cause diabetes mellitus. So the purpose of this study was to analyze the correlation between BMI with fasting blood glucose and HbA1c in office workers with central obesity. The design of this study was cross-sectional. The study population was office workers with central obesity at the Surabaya Prodia Laboratory who met the inclusion criteria. The sample was selected by purposive sampling technique. Data were collected through direct measurement, then analyzed by Spearman's rho test. The results showed that BMI was not correlated with fasting blood glucose (p -value = 0.364), nor was it correlated with HbA1c (p -value = 0.815).

Keywords: central obesity; body mass index; fasting blood glucose; HbA1c

ABSTRAK

Obesitas sentral adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari akumulasi lemak intra abdominal dan subkutan yang terjadi di daerah abdomen yang menyebabkan terjadinya resistensi insulin. Obesitas sentral diakibatkan karena asupan makanan berlebih dan penurunan aktifitas fisik yang sering terjadi pada pekerja kantor. Obesitas sentral dapat menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Sehingga tujuan penelitian ini adalah menganalisis korelasi antara IMT dengan glukosa darah puasa dan HbA1c pada pekerja kantor dengan obesitas sentral. Rancangan penelitian ini adalah cross-sectional. Populasi penelitian adalah pekerja kantor dengan obesitas sentral di Laboratorium Prodia Surabaya yang memenuhi kriteria inklusi. Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui pengukuran langsung, lalu dianalisis dengan uji *Spearman's rho*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMT tidak berkorelasi dengan glukosa darah puasa (p -value = 0,364), juga tidak berkorelasi dengan HbA1c (p -value = 0,815).

Kata kunci: obesitas sentral; indeks massa tubuh; glukosa darah puasa; HbA1c

PENDAHULUAN

Obesitas sentral adalah suatu keadaan dimana adanya akumulasi lemak intra abdominal dan subkutan yang terjadi di daerah abdomen yang dapat menyebabkan resistensi insulin sehingga glukosa sulit masuk ke sel dan menyebabkan kadar glukosa darah meningkat pada penyakit Diabetes Mellitus Tipe 2. Data dari Riskesdas tahun 2013, menunjukkan bahwa prevalensi obesitas pada kelompok umur dewasa sebesar 15,4 % dan overweight sebesar 13,5 %. Jika prevalensi obesitas dan overweight digabungkan, maka prevalensi penduduk Indonesia yang mengalami kelebihan berat badan sebesar 28,9 %, merupakan jumlah yang cukup besar karena lebih dari seperempat atau hampir setengah penduduk Indonesia pada kelompok umur dewasa mengalami kelebihan berat badan.⁽¹⁾

Prevalensi obesitas umumnya didapatkan dengan menilai status gizi menggunakan indeks massa tubuh (IMT), yang didefinisikan sebagai berat dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi dalam meter (kg/m^2). Berdasarkan IMT Asia Pasifik (Asia Pacific-BMI), memiliki $\text{IMT} \geq 25 \text{ kg}/\text{m}^2$ menandakan individu tersebut termasuk ke dalam golongan obesitas. Obesitas sentral yang diukur menggunakan lingkar pinggang ini memiliki hubungan erat dengan obesitas umum berdasarkan IMT. IMT memiliki korelasi yang sangat bermakna dengan besar lingkar pinggang pada perempuan dewasa (≥ 20 tahun) Untuk wilayah Asia dikategorikan obesitas sentral apabila ukuran lingkar pinggang adalah $\geq 90 \text{ cm}$ untuk pria dan $\geq 80 \text{ cm}$ untuk wanita⁽²⁾.

Obesitas beresiko pada diabetes berkaitan dengan terjadinya resistensi insulin. Sel lemak menghasilkan berbagai hormon yang disebut juga adipositokin (adipokine) berperan pada terjadinya resistensi insulin. Resistensi insulin ini paling sering dihubungkan dengan kegemukan. Akibat resistensi insulin itu, gula darah akan kesulitan masuk ke dalam sel sehingga gula di dalam darah tetap tinggi (hiperglikemi)⁽³⁾. Dampaknya resistensi insulin dan gangguan toleransi glukosa pada penderita obesitas tentunya akan berpengaruh pada kadar gula darah. Gula darah merupakan istilah kesehatan yang menunjuk kepada kandungan gula dalam aliran darah di tubuh, sehingga beresiko terjadinya pradiabetes. Sementara itu pradiabetes merupakan kondisi dimana kadar gula darah lebih tinggi dari batas normal, namun belum cukup jelas untuk mendiagnosa sebagai diabetes.

4

Pemeriksaan glukosa darah puasa adalah pemeriksaan glukosa yang dilakukan setelah pasien berpuasa selama 8-10 jam⁽⁴⁾. Menurut Perkeni tahun 2015, kriteria diagnosis diabetes melitus apabila pemeriksaan glukosa darah puasa $\geq 126 \text{ mg/dL}$ ⁽⁵⁾.

HbA1c merupakan baku emas untuk penilaian homeostasis glukosa darah. Hasil pemeriksaan HbA1c merupakan pemeriksaan tunggal yang sangat akurat untuk menilai status glikemik jangka panjang dan berguna pada semua tipe penyandang diabetes melitus. Manfaat HbA1c selama ini lebih banyak dikenal untuk menilai kualitas pengendalian glikemik jangka panjang dan menilai efektivitas terapi, namun saat ini HbA1c bukan hanya untuk pemantauan, tetapi juga bermanfaat dalam diagnosis ataupun skrining diabetes melitus tipe 2.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara IMT dengan glukosa darah puasa dan HbA1c pada pekerja kantor dengan obesitas sentral.

METODE

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan ran ~~25~~ gan *cross-sectional*. Populasi peneliti adalah pasien Laboratorium Prodia Surabaya yang mengalami obesitas sentral. Sa ~~15~~ el yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien Laboratorium Prodia Surabaya yang diambil secara *purposive sampling*, dim ~~11~~ sampel yang digunakan adalah sampel yang memenuhi kriteria inklusi obesitas sentral yaitu IMT $\geq 25 \text{ kg/m}^2$, lingkar pinggang laki-laki $\geq 90 \text{ cm}$, lingkar pinggang perempuan $\geq 80 \text{ cm}$. Sedangkan kriteria eksklusi yaitu memiliki riwayat penyakit diabetes melitus, mengkonsumsi obat yang mempengaruhi kadar glukosa darah, obat diet. Jumlah data yang digunakan oleh penelitian ini sebanyak 52 responden. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai dengan ~~8~~ Iaret 2020 di Laboratorium Prodia Surabaya.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah IMT dan variabel terikat adalah kadar glukosa darah puasa dan HbA1C. Data diambil melalui pengukuran lingkar pinggang dengan cara mengukur keliling perut melalui pertengahan krista iliaka (*iliac crest*) dengan tulang rusuk terbawah secara horizontal dengan menggunakan pita ukur atau metlin dengan tingkat ketelitian 0,1 cm. Pengukuran IMT dilakukan dengan mengukur berat badan menggunakan timbangan dengan ketelitian 0,1 kg dan tinggi badan menggunakan stat ~~26~~ meter dengan ketelitian 0,1 cm. Pemeriksaan Glukosa menggunakan metode ~~20~~ kinase. Pemeriksaan HbA1c menggunakan metode High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Data dianalisis menggunakan uji korelasi *Spearman's Rho*.

HASIL

Hasil analisis data disajikan pada tabel 1 sampai dengan tabel 5. Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 52 responden pada pekerja kantor dengan obesitas sentral yang mempunyai IMT tertinggi mayoritas berjenis kelamin perempuan (34%).

Tabel 1. Distribusi jenis kelamin responden

Jenis kelamin	Frekuensi	Percentase
Laki-laki	18	34.6
Perempuan	34	65.4

Dari tabel 2 diketahui bahwa rerata IMT responden $29,96 \text{ kg/m}^2$ dengan nilai minimum IMT $25,08 \text{ kg/m}^2$ dan nilai maksimum IMT $41,72 \text{ kg/m}^2$, rerata ukuran lingkar pinggang responden adalah $92,94 \text{ cm}$ dengan nilai minimum lingkar pinggang 82 cm dan nilai maksimum lingkar pinggang 112 cm dari 52 responden.

Tabel 2. Hasil pengukuran IMT dan lingkar pinggang

Hasil pengukuran	n	Minimum	Maksimum	Mean
IMT	52	25.08	41.72	29.9612
Lingkar Pinggang	52	82.00	112.00	92.9423

Tabel 3 menunjukkan bahwa kadar glukosa darah puasa responden yang meningkat adalah 15% dan kadar glukosa darah puasa responden yang normal adalah 85%.

Tabel 3. Distribusi kadar glukosa darah puasa

Kadar glukosa darah	Frekuensi	Percentase
Meningkat	8	15
Normal	44	85

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan kadar HbA1c

Kadar HbA1c	Jumlah	%
Meningkat	11	21
Normal	41	79

6

Tabel 4 menunjukkan bahwa kadar HbA1c responden yang meningkat adalah 21% dan kadar HbA1c responden yang normal adalah 79%.

Tabel 5. Hasil pemeriksaan kadar glukosa darah puasa dan kadar HbA1c

Hasil pemeriksaan	n	Min	Max	Mean
Glukosa	52	74.00	319.00	111.7500
HbA1c	52	4.60	16.20	6.2115

Tabel 5 menunjukkan bahwa rerata kadar glukosa darah puasa responden 111,75 mg/dL dengan nilai minimum kadar glukosa darah puasa 74 mg/dL dan nilai maksimum glukosa darah puasa 319 mg/dL, rerata kadar HbA1c 6,2 % dengan nilai minimum HbA1c 4,6 % dan nilai maksimum HbA1c 16,2 % dari 52 responden.

Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dengan statistik menggunakan program SPSS dengan uji korelasi *Spearman's Rho*, yang menunjukkan *p-value* = 0,364 maka data tersebut ²² menunjukkan tidak ada korelasi antara IMT dengan kadar glukosa darah puasa. Selain itu juga didapatkan *p-value* = 0,815 yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara IMT dengan HbA1c.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari 52 responden, rerata IMT responden 29,96 kg/m² dengan nilai minimum IMT 25,08 kg/m² dan nilai maksimum IMT 41,72 kg/m². Serta diketahui rerata kadar glukosa darah puasa responden 111,75 mg/dL dengan nilai minimum kadar glukosa darah puasa 74 mg/dL dan nilai maksimum glukosa darah puasa 319 mg/dL, rerata kadar HbA1c 6,2% dengan nilai minimum HbA1c 4,6% dan nilai maksimum HbA1c 16,2%. ²³

Berdasarkan hasil analisis korelasi disimpulkan bahwa tidak ¹⁸ korelasi antara IMT dengan glukosa darah puasa. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dalawa, et al. menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara status gizi dengan kadar glukosa darah, karena sebagian responden dengan kategori obesitas memiliki kadar glukosa darah normal. Menurut peneliti tingkat glukosa darah tergantung pada kegiatan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal yaitu adrenalin dan kortikosteroid. Adrenalin akan memacu kenaikan kebutuhan glukosa darah, dan kortikosteroid akan menurunkannya kembali⁽⁶⁾.

Berdasarkan hasil analisis korelasi juga didapatkan bahwa tidak ada korelasi antara IMT dengan HbA1c. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Goudswaard, et al. yang juga menyatakan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara kegemukan dengan kontrol glikemik. Hal ini menurutnya berkaitan dengan hubungan metabolismik antara lipid dengan glikemia. ⁽⁷⁾

21 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi Indeks Massa Tubuh (IMT) dengan kadar glukosa darah puasa dan kadar HbA1c pada pekerja kantor dengan obesitas sentral di wilayah Surabaya. Rerata kadar glukosa darah puasa dan HbA1c pada pekerja kantor dengan obesitas sentral di wilayah Surabaya berada dalam batas normal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kemenkes RI. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI; 2013.
2. IDF. The IDF Consensus Worldwide Definition of The Metabolic Syndrome. International Diabetes Federation; 2006.
3. Kurniadi H, Nurrahmi U. Stop! Diabetes, Hipertensi, Kolesterol Tinggi, Jantung Koroner. Yogyakarta: Istana Media; 2014.
4. Depkes RI. Pemeriksaan Gula Darah. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 1999.
5. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Konsensus Pengelolaan dan Pencegahan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Indonesia. Jakarta. Perkeni; 2015.
6. Dalawa FN, Kepel B, Hamel R. Hubungan Antara Status Gizi dengan Kadar Gula Darah Puasa Pada Masyarakat Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Manado. Ejournal Keperawatan (e-Kp). 2013;1(1).
7. Goudswaard AN, Stolk RP, Zuijthoff P, Rutten GPHM. Patient Characteristics do not Predict Poor Glycaemic Control in Type 2 Diabetes Patients Treated in Primary Care. European Journal of Epidemiology. 2004;19:541-545.

Darah_Puasa_dan_HbA1C_Pekerja_Kantor_dengan_Obesitas...

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|-----|
| 1 | Rika Fitriani Nur Fajrina, Ira Gustira Rahayu, Yeni Wahyuni, Mamat Rahmat. "AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK KULIT PISANG AMBON (MUSA ACUMINATA COLLA) TERHADAP STAPHYLOCOCCUS AUREUS SECARA IN-VITRO", JURNAL RISET KESEHATAN POLTEKKES DEPKES BANDUNG, 2019 | 1 % |
| 2 | dokumen.tips | 1 % |
| 3 | www.jusacemaxs.web.id | 1 % |
| 4 | repository.unimus.ac.id | 1 % |
| 5 | Submitted to Universitas Sam Ratulangi | 1 % |
| 6 | Wulandari Wulandari, Agusta Dian Ellina. "Telenursing terhadap Interdialytic Weight Gain dan Kualitas Pelayanan Keperawatan | 1 % |
- Publication
- Internet Source
- Internet Source
- Internet Source
- Student Paper

Hemodialisa", Jurnal Keperawatan Silampari, 2022

Publication

7	repository.fdk.ac.id Internet Source	1 %
8	Sonia Hadiyanti, Harmayetty Harmayetty, Ika Yuni Widyawati. "(RETRACTED) Pengaruh Pemberian Model Latihan Isometrik Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Mencit (Mus Musculus) Diabetes Mellitus", <i>Jurnal Keperawatan Terpadu (Integrated Nursing Journal)</i> , 2019 Publication	1 %
9	ecc.isc.ac Internet Source	1 %
10	id.scribd.com Internet Source	1 %
11	deotera.wordpress.com Internet Source	1 %
12	renikar.blogspot.com Internet Source	1 %
13	repository.ippm.unila.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.stikesdrsoebandi.ac.id Internet Source	1 %
repository.uksw.edu		

Internet Source

15

1 %

16

www.slideshare.net

1 %

17

www.scribd.com

1 %

18

adoc.pub

1 %

19

repository.poltekkesbdg.info

1 %

20

repository.unair.ac.id

1 %

21

text-id.123dok.com

1 %

22

Sari Wahyuni Mustarim, Busjra M. Nur,
Rohman Azzam. "Faktor-Faktor yang
Berhubungan dengan Self Management pada
Pasien DM Tipe II", Journal of Telenursing
(JOTING), 2019

<1 %

Publication

23

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Surakarta

<1 %

Student Paper

24

eprints.undip.ac.id

<1 %

Internet Source

25	fr.scribd.com Internet Source	<1 %
26	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
27	pesquisa.bvsalud.org Internet Source	<1 %
28	vdocuments.site Internet Source	<1 %
29	Keller. Encyclopedia of Obesity Publication	<1 %
30	"Abstracts of the 47th Annual Meeting of the EASD, Lisbon 2011", Diabetologia, 2011 Publication	<1 %
31	I Gede Agus Artana, Putu Wira Kusuma Putra, Desak Putu Risna Dewi. "Nursing Work Ergonomics Knowledge Relating to Musculoskeletal Complaints in Inpatient Room RSD Mangusada", Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan, 2021 Publication	<1 %
32	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

Off

Exclude bibliography On